

Factsheet Indicatoren Dutch Parkinson's Insight Audit (DPIA)

DPIA: 2018.1

Registratie gestart: 2015

Datum	Versie	Mutatie	Eigenaar
21-10-2015	2016.1	Aanpassingen conform indicatoredagen oktober 2015	DICA
	2016.1	Verwijderen oude indicator 1,3, 6 en 8	DICA
07-07-2016	2017.1	Aanpassingen conform indicatoredagen 2016	DICA
08-05-2017	2018.1	Aanpassingen zoals besproken in de WSCie	DICA/WSCie
28-06-2018	2018.2	Aanpassingen nav besluiten indicatoredagen in juni 2017	DICA
27-10-2017	2018.3	Regel 'transparantie' toegevoegd n.a.v. besluit ZiNL (november 2017) over verplichte en vrijwillige transparantie van indicatoren.	DICA

Inclusie & exclusie criteria DPIA

Inclusie

- Alle patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 501)

Exclusie

- Patiënten met een andere Parkinsonisme (DBC 502)
- Patiënten jonger dan 18 jaar

Indicatorenoverzicht

Nr.	Indicator*	Type indicator	Uitvraag over (jaar)	Bron	Transparantie
1.	Percentage patiënten dat geregistreerd is in de DPIA, waarbij de informatie in de registratie volledig is.	Proces	2018	DPIA	Verplicht
2.	Aantal patiënten per ziekenhuis en per neuroloog.	Structuur	2018	DPIA	Verplicht
3.	Percentage patiënten waarbij een gespecialiseerd verpleegkundige betrokken is.	Proces	2018	DPIA	Verplicht
5.	Percentage patiënten dat medische hulp heeft ingeschakeld vanwege letsel opgelopen bij een valincident.	Uitkomst	2018	DPIA	Verplicht
7.	Percentage patiënten dat heeft deelgenomen aan de PROMs vragenlijst.	Proces	2018	PROMS	Verplicht
8.	Gemiddeld scoringspercentages op de CQI.	Uitkomst	2018	PROMS	Verplicht
9.	Gemiddeld scoringspercentage op de PDQ-8.	Uitkomst	2018	PROMS	Verplicht
10.	Gemiddeld scoringspercentage op de Modified Caregiver Strain Index (MCSI).	Uitkomst	2018	PROMS	Verplicht

*Indicatoren worden berekend over het aantal patiënten dat in de DPIA is geregistreerd.

1. Volledigheid

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten dat geregistreerd is in de DPIA, waarbij de informatie in de registratie volledig is.
Teller	Aantal patiënten van wie de informatie in de registratie volledig* is.
Noemer	Aantal ingevoerde patiënten in de DPIA.
Definitie (s)	*Volledig: Analyseerbare^ patiënten waarbij alle items die nodig zijn voor het berekenen van de externe indicatoren geregistreerd zijn. ^ Analyseerbaar: minimaal vereiste items zijn: geboortedatum, consultdatum en indien van toepassing: diagnose, datum eerste DBC/jaar van diagnose.
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van DPIA.
Norm	-
Uitvraag:	01-01-2018 t/m 31-12-2018
Transparantie	Verplicht

2. Aantal patiënten ziekenhuis

Indicator	
Operationalisatie	Aantal patiënten per ziekenhuis en per neuroloog*.
Teller A	Aantal patiënten per ziektefase per ziekenhuis.
Teller B	Aantal patiënten per ziektefase per neuroloog*.
Definitie (s)	Ziektefasen: a. Fase 1: Patiënten met ziekte duur van 0 tot 5 jaar. b. Fase 2: Patiënten met ziekte duur van 6 tot 10 jaar. c. Fase 3: Patiënten met ziekte duur van meer dan 10 jaar. * Geanonimiseerd.
Norm	-
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van DPIA.
Uitvraag over	01-01-2018 t/m 31-12-2018
Transparantie	Verplicht
Disclaimer	Deze indicator geeft inzicht in de verdeling van aantal Parkinson-patiënten over de verschillende neurologen binnen het ziekenhuis. De achtergrond bij deze indicator is dat er patiënten kunnen zijn die al lange tijd (> 5 jaar of > 10 jaar) ziek zijn, en die de voorkeur geven om bij een neuroloog onder behandeling te zijn die extra ervaring heeft met patiënten in deze fase van de ziekte. Verschil in resultaten van de behandeling tussen neurologen met minder of meer patiënten is niet wetenschappelijk vastgesteld. In Nederland geldt dat alle neurologen in Nederland zijn opgeleid om de ziekte van Parkinson te diagnosticeren en te behandelen. Vaak vindt binnen een ziekenhuis overleg plaats tussen neurologen met minder en neurologen met meer patiënten met de ziekte van Parkinson. Sommige neurologen hebben extra expertise/affiniteit met dit bepaalde vakgebied. Dat kan zich vertalen in een groter aantal patiënten met deze aandoening. Er wordt bij de indicator over het aantal patiënten dat bij een bepaalde neuroloog onder behandeling is daarom onderscheid gemaakt tussen patiënten die de diagnose relatief kort geleden kregen en patiënten die de ziekte al langer hebben. Als patiënt kunt u zelf kiezen voor een behandelaar. U bepaalt zelf wat u belangrijk vindt: ervaring met deze specifieke ziekte, wachttijd, eerdere ervaring van uzelf of andere patiënten, etc.

3. Gespecialiseerd verpleegkundige

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten waarbij een gespecialiseerd verpleegkundige betrokken is.
Teller	Aantal patiënten met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of email contact en/of een (thuis)consult met een gespecialiseerde verpleegkundige.
Noemer	Aantal patiënten per ziektefase.
Definitie (s)	<p>Ziektefasen:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Fase 1: Patiënten met ziekte duur van 0 tot 5 jaar.b. Fase 2: Patiënten met ziekte duur van 6 tot 10 jaar.c. Fase 3: Patiënten met ziekte duur van meer dan 10 jaar. <p>Gespecialiseerde verpleegkundige of parkinsonverpleegkundige of nurse practitioners (geen physician assistant).</p> <p>Emailcontact in ruimste zin van het woord.</p>
Norm	-
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van DPIA.
Uitvraag over	01-01-2018 t/m 31-12-2018
Transparantie	Verplicht

5. Valincident	
Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten dat medische hulp heeft ingeschakeld vanwege letsel opgelopen bij een valincident.
Teller	Aantal patiënten per ziektefase dat een valaccident met letsel heeft gehad.
Noemer	Aantal patiënten per ziektefase.
Definitie (s)	<p>Ziektefasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fase 1: Patiënten met ziekte duur van 0 tot 5 jaar. b. Fase 2: Patiënten met ziekte duur van 6 tot 10 jaar. c. Fase 3: Patiënten met ziekte duur van meer dan 10 jaar. <p>Definitie van letsel: letsel waarvoor medische hulp is ingeroepen. Medische hulp: het inschakelen van een arts.</p>
Norm	-
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van DPIA.
Uitvraag over	01-01-2017 t/m 31-12-2018
Transparantie	Verplicht

7. Responspercentage PROMs

Indicator	
Operationalisatie	Percentage patiënten dat heeft deelgenomen aan de PROMs vragenlijst.
Teller	Aantal behandelde patiënten dat heeft deelgenomen aan de PROMs vragenlijst.
Noemer	Aantal patiënten opgenomen in de klinische registratie van de DPIA.
Definitie (s)	
Norm	-
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van DPIA.
Uitvraag over	01-01-2018 t/m 31-12-2018
Transparantie	Verplicht

8. Patiëntervaringen CQI

Indicator	
Operationalisatie	Gemiddeld scoringspercentages op de CQI.
Teller A	Gemiddeld scoringspercentage op de CQ-index ziekte van Parkinson (PCQ-PD).*
Definitie (s)	<p>Gecorrigeerd voor ziektefasen. Fase 1: Patiënten met ziekte duur van 0 tot 5 jaar. Fase 2: Patiënten met ziekte duur van 6 tot 10 jaar. Fase 3: Patiënten met ziekte duur van meer dan 10 jaar.</p> <p>Scoringspercentage wordt berekend door de behaalde score af te zetten tegen de maximaal te behalen score en is een gemiddelde van alle patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld.</p> <p>Minimaal 30 patiënten per ziekenhuis moeten de PROMs vragenlijst hebben ingevuld om deze indicator te kunnen berekenen.</p> <p>Eenmaal per jaar worden er vragenlijsten naar de patiënt gestuurd.</p>
Norm	-
In-/ exclusiecriteria	<p>Zie in-/exclusiecriteria van DPIA</p> <p>Minimaal 30 patiënten per ziekenhuis moeten de CQI vragenlijst hebben ingevuld om deze te kunnen berekenen.</p>
Uitvraag over	01-01-2018 t/m 31-12-2018
Transparantie	Verplicht

9. PDQ-8

Indicator	
Operationalisatie	Gemiddeld scoringspercentage op de PDQ-8.
Teller	Gemiddeld scoringspercentage op de PDQ-8.*
Definitie (s)	<p>PDQ-8 is een meetinstrument bestaande uit een selectie van 8 vragen van de PDQ-39. Iedere vraag is geselecteerd uit een van de dimensies van de PDQ-39: mobiliteit, algemene dagelijkse levensverrichtingen, emotioneel welzijn, stigmatisering, sociale steun, cognitie, communicatie en lichamelijk ongemak.</p> <p>Scoringspercentage wordt berekend door de behaalde score af te zetten tegen de maximaal te behalen score en is een gemiddelde van alle patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld.</p> <p>* Gecorrigeerd voor ziektefasen. Fase 1: Patiënten met ziekte duur van 0 tot 5 jaar. Fase 2: Patiënten met ziekte duur van 6 tot 10 jaar. Fase 3: Patiënten met ziekte duur van meer dan 10 jaar.</p> <p>Minimaal 30 patiënten per ziekenhuis moeten de PROMs vragenlijst hebben ingevuld om deze indicator te kunnen berekenen.</p>
Norm	-
In-/ exclusiecriteria	Zie in-/exclusiecriteria van DPIA.
Uitvraag over	01-01-2018 t/m 31-12-2018
Transparantie	Verplicht

10. Mantelzorg belasting	
Indicator	
Operationalisatie	Gemiddeld scoringspercentage op de Modified Caregiver Strain Index (MCSI).
Teller	Gemiddeld scoringspercentage op de MCSI.*
Definitie (s)	Scoringspercentage wordt berekend door de behaalde score af te zetten tegen de maximaal te behalen score en is een gemiddelde van alle patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld. * Gecorrigeerd voor ziektefasen. Fase 1: Patiënten met ziekte duur van 0 tot 5 jaar. Fase 2: Patiënten met ziekte duur van 6 tot 10 jaar. Fase 3: Patiënten met ziekte duur van meer dan 10 jaar. Minimaal 30 mantelzorgers per ziekenhuis moeten de PROMs vragenlijst hebben ingevuld om deze indicator te kunnen berekenen.
Norm	-
In-/ exclusiecriteria	Zie verder in- en exclusiecriteria van DPIA.
Uitvraag over	01-01-2018 t/m 31-12-2018
Transparantie	Verplicht